



Le système digestif

USANA^{MD} Digestive Enzyme

Un supplément avec enzymes qui favorise la digestion



Les aliments crus contiennent des enzymes en abondance pour favoriser la digestion. Cependant, rares sont les gens dont le régime se compose strictement d'aliments crus. Les enzymes dans la nourriture sont détruites par la cuisson et l'organisme doit en fabriquer pour digérer les aliments. Le supplément **USANA Digestive Enzyme** fournit des enzymes qui aident à digérer les repas de façon plus efficace. Avec la spiruline ajoutée, cette formule unique favorise également les processus naturels de l'organisme pour éliminer les toxines.

LA DIGESTION

Lorsque nous consommons des aliments comme le pain, la viande et les légumes, ils ne se présentent pas sous une forme que l'organisme peut utiliser pour se nourrir. Les aliments et les boissons doivent être transformés en molécules nutritives plus petites avant d'être absorbés et distribués aux cellules partout dans l'organisme. La nourriture est mastiquée dans la bouche, tout en se mêlant aux substances chimiques et enzymes contenues dans la salive produite par les glandes salivaires. Elle descend ensuite le long de l'œsophage jusqu'à l'estomac où un acide détruit la plupart des micro-organismes contaminants et entreprend la décomposition mécanique et chimique de certains aliments.

Pendant le processus digestif, l'estomac remplit trois fonctions : il emmagasine d'abord les aliments et les boissons, il les mélange ensuite au suc gastrique et enfin, il envoie lentement le contenu stomacal dans l'intestin grêle.

Une fois ces fonctions remplies (règle générale, une heure ou deux chez les humains), les aliments aboutissent dans l'intestin grêle où la digestion et l'absorption s'effectuent en grande partie. Ils sont encore une fois mélangés à trois autres substances : la bile, produite par le foie et emmagasinée dans la vésicule biliaire, qui émulsifie les gras; le suc pancréatique sécrété par le pancréas; et les enzymes intestinales sécrétées par les membranes muqueuses qui traitent de nouveau les sucres et les protéines.

La matière qui en résulte passe dans l'intestin grêle, puis au gros intestin où des molécules complexes sont encore une fois digérées et absorbées. Les produits alimentaires non digestibles (les fibres) sont mélangés à de l'eau et des déchets, agglomérés et expulsés dans les selles.

Sans un fonctionnement enzymatique optimal, la santé du système digestif peut se voir compromise.

L'IMPORTANCE DES ENZYMES DIGESTIVES

Combien d'entre nous consommons tous les jours des aliments crus, qui sont remplis d'enzymes importantes pour la santé humaine? Le régime alimentaire d'aujourd'hui contient nettement moins d'enzymes en raison de la cuisson et de la transformation des aliments. Au cours du siècle dernier, de nombreux chercheurs ont soutenu que cette perte d'enzymes alimentaires pouvait être un facteur important d'une mauvaise santé avec l'âge.

USANA Digestive Enzyme assure le surcroît d'enzymes dont l'organisme peut avoir besoin pour décomposer la cellulose (des fruits et légumes), ainsi que les gras, protéines, glucides et amidons que nous consommons, afin de mettre les macronutriments à la disposition des cellules.

LA SPIRULINE

En plus de favoriser une bonne digestion, **USANA Digestive Enzyme** aide aux processus naturels de détoxification de l'organisme grâce à l'ajout de spiruline, une algue de couleur cyan et riche en nutriments qui contient de la chlorophylle. Cette dernière substance aide à éliminer les toxines de l'organisme.

La spiruline est un « super aliment » rempli de nutriments. Elle est riche en acides aminés, en vitamines A, C, E ainsi que B6, en phytonutriments et en minéraux, notamment le magnésium. Le foie, principal organe de filtrage de l'organisme, dépend de ces nutriments pour bien fonctionner.

POURQUOI USANA^{MD} DIGESTIVE ENZYME?

Les suppléments **USANA Digestive Enzyme** aident à compenser la production inadéquate et la baisse progressive des enzymes. Le produit est conçu pour favoriser une digestion et une absorption plus complètes des macronutriments. Avec l'ajout de spiruline, la formule d'USANA est vraiment unique dans le secteur des suppléments.

ARTICLE N° 111

RECOMMENDED USE: DIGESTIVE AID. / **USAGE RECOMMANDÉ :** FAVORISE LA DIGESTION.

RECOMMENDED ADULT DOSE: TAKE ONE (1) TABLET THREE TIMES A DAY WITH A MEAL. KEEP TABLETS IN ORIGINAL CONTAINER WITH THE LID TIGHTLY CLOSED BETWEEN USES. STORE IN A COOL, DRY PLACE. / **DOSE RECOMMANDÉE POUR ADULTES :** PRENDRE UN (1) COMPRIMÉ TROIS FOIS PAR JOUR AVEC UN REPAS. CONSERVER LES COMPRIMÉS DANS LEUR CONTENANT ORIGINAL. LE COUVERCLE BIEN FERMÉ ENTRE LES UTILISATIONS. GARDER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

EACH TABLET CONTAINS:

MEDICINAL INGREDIENTS

SPIRULINA 150 mg

ALPHA-AMYLASE (3,000 DU) 33 mg

BROMELAIN (750,000 PU) 25 mg

PROTEASE (15,000 HUT) 25 mg

LIPASE (350 LIPU) 17.5 mg

LACTASE (1,000 ALU) 11.5 mg

PAPAIN (250,000 PU) 5 mg

CELLULOSE (130 CI) 3.25 mg

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, CROSCARMELLOSE, SODIUM PREGELATINIZED STARCH, ASCORBYL PALMITATE, SILICON DIOXIDE, DEXTRIN, VANILLA EXTRACT, DEXTROSE, SOY LECITHIN, SODIUM CITRATE / **INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX :** CELLULOSE MICROCRYSTALLINE, CROSCARMELLOSE SODIUM, AMIDON PREGÉLATINISÉ, PALMITATE D'ASCORBYLE, DIOXYDE DE SILICUM, DEXTRINE, EXTRAIT DE VANILLE, DEXTROSE, LÉCITHINE DE SOJA, CITRATE DE SODIUM.

NO ANIMAL-DERIVED INGREDIENTS / AUCUN INGRÉDIENT D'ORIGINE ANIMALE.

FOR PROLONGED USE, CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU ARE PREGNANT, NURSING, TAKING A PRESCRIPTION DRUG, HAVE DIABETES OR GALACTOSEMIA, OR HAVE ANY OTHER MEDICAL CONDITION. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE GASTROINTESTINAL LESIONS/ULCERS, ARE TAKING ANTICOAGULANT AGENTS, ANTI-INFLAMMATORY AGENTS, ANTIBIOTICS OR OTHER ENZYME PRODUCTS OR BEFORE HAVING SURGERY. DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATIQUES, OU AVANT UNE OPÉRATION CHIRURGICALE. CÉSSEZ D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ SI DES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT OU DANS LES CAS SUIVANTS QUI ONT ÉTÉ RAPPORTÉS : MAUX DE TÊTE, BRÛLURES D'ESTOMAC, BALLONNEMENT, NAUSEE, VOMISSEMENT, DIARRHÉE ET HYPERSENSIBILITÉ (PAR EX. : ALLERGIE). CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AU LATEX OU À CERTAINS FRUITS (AVOCAT, BANANE, CHATAIGNE, FRUIT DE LA PASSION, FIGUE, MELON, MANGUE, KIW, ANANAS, PÊCHE ET TOMATE).

IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN. HEADACHES, HEARTBURN, BLOATING, NAUSEA, VOMITING, DIARRHOEA, AND HYPERSENSITIVITY (E.G. ALLERGY) HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR. IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTH-CARE PRACTITIONER. CONSULT YOUR PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU HAVE ALLERGY TO LATEX OR FRUITS (SUCH AS AVOCADO, BANANA, CHESTNUT, PASSION FRUIT, MELON, MANGO, KIW, PINEAPPLE, PEACH, AND TOMATO). / POUR UN USAGE PROLONGÉ, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITÉZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DELAIRE SUR ORDONNANCE, OU SI VOUS SOUFFREZ DE DIABÈTE, DE GALACTOSEMIE OU DE TOUT AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ. AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES LÉSIONS OU ULCÈRES GASTRO-INTESTINAUX OU SI VOUS PRENEZ DES AGENTS ANTICOAGULANTS OU ANTI-INFLAMMATOIRES, DES ANTIBIOTIQUES OU D'AUTRES PRODUITS ENZYMATI